

Pimenteira Bastarda

Nome Vulgar: Aroeira Salsa

Nome Científico: *Schinus molle*

Época de Floração: As flores da pimenteira são pequenas, unisexuais, são de cor branca e apresentam-se em cacho. A sua época de floração ocorre entre setembro e novembro.



Fruto: Os frutos são esféricos de 2 a 4 milímetros de diâmetro, cor-de-rosa ou vermelho. O período de frutificação é entre dezembro e janeiro.

Idade Máxima: Idade Indeterminada.

Utilizações: A resina da pimenteira utiliza-se como medicamento e os frutos moídos servem como pimenta. A árvore é plantada como quebra-vento, para sombra e ornamentar os jardins. Também é utilizada na medicina tradicional.

Bibliografia:

www.jardimdasideias.com.br

https://www.cascais.pt/sites/default/files/anexos/gerais/natureza_guia_arvores_cascais.pdf

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pimenteira_bastarda

<http://br.innatia.com/c-outros-chas-e-infusoes-pt/a-pimenteira-bastarda-conheca-suas-propriedades-curativas-e-como-toma-la-6333.html>

<https://dias-com-arvores.blogspot.pt/2005/08/falsa-pimenteira.html>

<https://jardim-bordalo.com/jardim/pimenteira-bastarda/>

https://jb.utad.pt/especie/Schinus_molle

Trabalho realizado pelo 4º F do Agrupamento de Escolas José Cardoso Pires –
Escola Básica J/I José Garcês