

## Amoreira

**Nome vulgar:** Amoreira Branca e Amoreira Preta

**Nome científico:** *Morus*

**Época da floração:** A floração ocorre entre março e maio.

**Fruto:** Amora

- *Morus Rubra* - amora vermelha;
- *Morus Alba* - amora branca;
- *Morus Nigra* - amora preta.

Frutifica no verão.

**Idade máxima:** Pode durar entre 75 a 200 anos. Começa a frutificar entre o 8.º a 10.º ano, tendo o seu máximo produtivo entre os 20 e os 25 anos de vida.

**Utilizações:** As folhas da amoreira-branca servem de alimento aos bichos da ceda. A amora negra costuma ser utilizada no consumo humano, pelo seu sabor mais pronunciado e bagas maiores.

Os seus frutos são utilizados para fazer geleias, compotas, xaropes e licores.

A amoreira é utilizada como árvore decorativa, apesar de não alcançar muita altura, a sua copa, de folhas abundantes, proporciona boa sombra.

É uma árvore de folha caduca de crescimento rápido e de porte médio, podendo alcançar facilmente os 12 metros de altura. As suas folhas têm a forma de coração.

Originária da Ásia, as amoreiras foram, provavelmente, introduzidas na Europa por volta do século XVII, sendo também uma espécie característica das regiões temperadas e subtropicais da Ásia, África e América do Norte.

**Fontes utilizadas:** [quintapedagogica.cm-lisboa.pt/uploads/media/Ficha\\_tecnica\\_amoreira.pdf](http://quintapedagogica.cm-lisboa.pt/uploads/media/Ficha_tecnica_amoreira.pdf)  
[faunaeflora.terradagente.g1.globo.com](http://faunaeflora.terradagente.g1.globo.com) > FLORA > ARVORES-PALMEIRAS;  
[http://quintapedagogica.cm-lisboa.pt/uploads/media/Ficha\\_tecnica\\_amoreira.pdf](http://quintapedagogica.cm-lisboa.pt/uploads/media/Ficha_tecnica_amoreira.pdf)

